



Vad är pulpitis eller tandvärk?

Pulpitis orsakas av en inflammation i massan inuti tanden. Massa är en del av insidan av tanden som har vävnad och nerver. Som i alla infektioner, kroppen svaren med ökad omsättning levererande blodkärlen expandera. Tandvärk följer vanligtvis skada till tanden. Dental massa att vara ett ämne i mitten av tanden består av bindväv och celler. Den vanligaste formen av skada att tanden är karies eller en hålighet. Detta är ofta ett resultat av dålig tandhygien. Socker och stärkelse i livsmedel är de ämnen som orsakar skador på tänderna. En tand med akut pulpitis är mycket känslig för temperatur i vissa fall en kronisk bultande smärta. Smärta är ett resultat av trycket av massa eftersom det sväller mot insidan väggar av tanden. I pulpitis acuta serosa orsaka förlängd kapillär fartyg utsöndring av granulocyter och serum. Den orsakas vanligtvis av karies som kan tränga igenom

de emalj och dentin lagrarna av tanden att nå massa, eller av trauma som skadar dessa lager. Repetitiva trauma kan men också orsaka massa att bli inflammerad utan infektion, som kan vara resultatet av en feljusterad käke, eller slipning i natt.

Symtom på Pulpitis eller tandvärk

Symtomen vid tandvärk kan likna andra sjukdomstillstånd eller tandproblem. Tandvärk är vanligtvis diagnosen baseras på en fullständig anamnes och klinisk undersökning. Följande är de vanligaste symtomen på en Pulpitis. Symtomen kan vara konstant smärta i en tand, tand är smärtsamma för beröring, smärta i tanden som förvärras med varm eller kall mat eller vätskor, tand normalt reagerar socker, käken i området av tanden som är öm och anbud till touch, feber, dental bölder kan uppstå när pulpitis är avancerad. När pulpitis inte är alltför avancerad försvinner smärtan så fort problemet tas bort. När pulpitis är avancerade och potentiellt irreversibla, dröjer smärtan för länge. Kronisk pulpitis är å andra sidan ofta helt utan symtom. Det orsakas vanligtvis av karies. Vita blodkroppar ansamlas i Pulpaen att bekämpa inflammation. I reversibel, akut pulpitis reagerar tanden till sötma, kyla och värme. Smärtan varar

en kort stund bara. I irreversibel pulpitis, som kan vara akut eller kronisk, är tanden permanent smärtsamt. Dentinen är ofta förstörde upp till det pulpal hålet och cariously ändras. Smärta fortsätter även efter karies borttagning. En skadad pulpa kan inte återföras till sitt ursprungliga friska tillstånd, den är oåterkallelig, helt enkelt ta bort irriterande från fruktköttet inte kommer att räcka att stoppa pulpitis. I sådana situationer är det nödvändigt för massan avlägsnas genom rotfyllning. Vitalitet förlust av tand mörgen leder till pulpal nekros som inledningsvis visar inga symtom. Detta kan ske genom en bakteriell infektion som kallbrand eller efter trauma utan medverkan av bakterier.

Behandling för Pulpitis eller tandvärk

Behandling av tandvärk inleds vanligtvis genom att behandla orsaken till den pulpitis som kommer att omfatta avlägsnande av alla irriterande. Specifik behandling för en Pulpitis kommer att fastställas utifrån sjukdomshistoria, omfattningen av villkora, tolerans för särskilda läkemedel, förfaranden, eller terapier och behandling kan innehålla antibiotika, smärta läkemedel, fullständig eller partiell tandutdragnings, tömning av en böld, ibland är det nödvändigt för massa tas bort av root canal ett kirurgiskt in-

grepp som innebär avlägsnande av den skadade nerver och vävnad från mitten av tanden. Om sjukdomen lämnas obehandlade, anaerob Förrotnelsebakterier bryts ner av död vävnad och resultera i kallbrand.