



Visdomständer eller tredje molarer, extraheras oftare än alla andra tänder. Vissa människor har naturligtvis tillräckligt med utrymme i deras munnar att rymma utbrott av visdomständer. De som inte har utrymme för ytterligare tänder kan lida påverkade visdomständer, ett tillstånd där tänderna förbli begravda under tandköttet eller utbrott ligger i linje med resten av tänderna. Visdomständer påverkas under tandköttskanten kan orsaka smärta, svullnad och publiken eller tvingas flytta andra tänder. Smärta är en av de första frågorna som folk har när de överväger visdomständer borttagning. Även om viss obehag förväntas, extrem smärta är inte typiska och kan vara ett tecken på en torr socket som enkelt kan behandlas. Komplikationer är en väsentlig del av sjukdomstillstånd samt förfaranden. Ett sådant område är tandutdragning, som kan utveckla komplikationer, som kan åsamkas under förfarandet eller efter. Det är ansett att visdomständer utvinning förfarande är mer benägna att sådana

komplikationer, på grund av dess positionering i käkbenet. Att vara en multi försvårar rotade tand extraktionsmetod av visdomständer. En sådan komplikation i samband med tand extraktionsförfarande, särskilt visdom tandutdragning, är torr socket. En torr socket händer när koagel upplöser alltför snart lämnar ben och nerven utsätts för luft, mat, vätska, etc. Det finns en massa skräckhistorier om visdomständer borttagning och torr sockets, är sanningen att många patienter inte upplever något obehag alls.

För att förstå de tillstånd som kallas dry socket, måste du ha en grundläggande idé om tanden uttaget. En tanden uttaget är en hålighet i käken, som inrymmer roten till att tanden. Processen för tandutdragning innebär kraftfullt avlägsnande av tanden, som är knuten till uttaget. När tanden tas bort från uttaget, uttaget blir fylld med blodproppar. Dessa blodproppar skydda ben och nerver, som ligger under tanden som utvinns. Tandens dras ut, få ben och nerver exponeras som blivit utsatta för skador. Detta förhindras av blodpropp som bildas i uttaget. I normala fall tandkött växer att täcka upp öppna uttaget inom en vecka, och inom sex månader, ben växer i uttaget och fyller den. Bildandet av blodproppar i uttaget sker dock inte i vissa människor. I några

andra, blir blodpropp upplöst eller fördrev några dagar efter tandutdragning. Detta kan hända olika faktorer som inte kan förutsägas eller slarv av patienten. Avsaknad av en blodpropp i öppna uttaget leder till de underliggande ben och nerver exponering för luft, matrester och vätskor.

Detta tillstånd kallas torr socket, som annars kallas akut alveolära osteitis. Torr socket symtom är en tråkig bultande smärta med en illaluktande andedräft och en dålig smak i munnen. Situationen förvärras som matrester fastna i området leder till en infektion. Torr uttagen efter visdomständer utvinning är mer benägna att utveckla hos rökare. För att undvika en torr socket, rekommenderar tandläkare patienten att avstå från rökning, blåser sin näsa, spotta, dricka med sugrör, nysningar och spela musikinstrument, efter att ha genomgått en tand extraktionsmetod. I själva verket kan någon aktivitet som orsakar en variation i trycket inne i munnen orsaka en torr socket efter visdomständer borttagning. Den exakta orsaken till det tillstånd som kallas torr socket är fortfarande inte känt. Det är därför läkare föreslå förebyggande åtgärder för att undvika detta villkor. Dock har det observerats att detta villkor är ofta associerad med svåra tand extraktioner. Detta förklarar varför visdom-

ständer och torr socket är mer kopplade till varandra. Det föreslås också att patienterna måste avstå från att dricka kolsyrade drycker och alkohol för ett par dagar efter tandutdragning. Även sköljning av munnen bör undvikas för en dag.

Vanligtvis kommer att din tandläkare skölja ut tomma uttaget, ta bort eventuellt skräp och tillämpa medicinska förband för att skydda området och minska smärta. Tandläkaren kan också ordinera ett antibiotikum för att förhindra infektion och smärtstillande medel att lindra obehag. Tandläkaren kan ge dig råd vad man ska äta eller dricka samt hur man rengör och vårdar torr socket området. Med rätt skötsel och resten, bör de torra socket läka i sju till tio dagar. Din tandläkare kommer nog be att du schemalägger en följa upp avtalad tid att övervaka healing och se hur du gör. I de flesta fall läker visdomständer torr socket av sig själv inom femton till tjugo dagar. Torr socket kan framkalla efter utvinning av någon tand, men det är mest associerad med visdomständer, möjligtvis på grund av visdomständer borttagning komplikationer. Om du förbereder för visdom tandutdragning, se till att du följer instruktionerna för din tandläkare, för att undvika torra socket.